

METFORMIN

*–Till dig som
förskrivits
Metformin vid PCO*

Metformin är ett läkemedel som förbättrar insulin-känsligheten i kroppen och är farmtaget för behandling av diabetes typ 2.

Metformin används också vid PCO för att gå ner i vikt och återfå normala menstrationer.

Det är vanligt med biverkningar från magtarmkanalen som illamående, gaser och lös avföring. Biverkningarna är ofarliga och kan vara besvärande men blir ofta lindrigare med tiden.

En vanlig startdos är en tablett om dagen, efter en vecka ökas dosen till två tabletter per dag och efter ytterligare en vecka kan man höja dosen till tre

tabletter dagligen. Tabletterna ska alltid tas i samband med måltid; frukost, lunch och kvällsmat.

Det är viktigt att du bara tar Metformin de dagar du äter som vanligt. Ta absolut inte tableterna vid magsjuka, diarre eller vid fasta. Avstå också från tableterna om du ska ta kontrast inför en röntgen undersökning eller om ska dricka alkohol (*mer än ett standardglas alkohol*).

Informera alltid din behandlande läkare att du behandlas med Metformin.

Gynmottagning

 Tudorkliniken

Boka tid på 035-12 15 30. Du kan själv enkelt avboka, omboka eller förnya ditt recept på 1177.se.